

# Ενημερωτική Εκδοση για τις Λοιμώξεις

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2002  
Τεύχη 101, 102

Συντακτική Επιτροπή:  
Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  
Γ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ - ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

## ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ, ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ, ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 2002

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται, τα αντιμυκητιακά, τα αντι-ιικά και τα αντιφυματικά φάρμακα και συγκεκριμένα η χημική ονομασία τους, τα ιδιοσκευάσματα, οι μορφές τους, η προτεινόμενη δοσολογία για ενήλικες και παιδιά, το μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων, καθώς και η μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση. Οι συνιστώμενες δόσεις έχουν επιλεγεί βάσει κλινικών μελετών και αφορούν σε άτομα με φυσιολογική νεφρική και ηπατική λειτουργία.

## ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ, ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ, ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΡΦΕΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ημερήσια δόση		ΠΑΙΔΙΑ Ημερήσια δόση		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΑ</b>						
<b>Αμφοτερικίνη Β<sup>1</sup></b> ( <i>Fungizone</i> ) Inj Vial 50 mg, IV Διατίθεται από ΙΦΕΤ		0,25-1,5 mg/kg IV έγχυση σε 6 ώρες		0,25-1,5 mg/kg IV έγχυση σε 6 ώρες	24-48	1-1,5 mg/kg
<b>Αμφοτερικίνη Β λιποσωμική</b> ( <i>Ambisome</i> ) Inj Vial 50 mg, IV		5 mg/kg IV έγχυση σε 2-3 ώρες		5 mg/kg IV έγχυση σε 2-3 ώρες	24	10-15 mg/kg
<b>Αμφοτερικίνη Β λιπιδικό σύμπλεγμα</b> ( <i>Abelcet</i> ) Inj Vial 10 x 20 ml x 100 mg, IV		5 mg/kg IV έγχυση σε 2-3 ώρες		5 mg/kg IV έγχυση σε 2-3 ώρες	24	10 mg/kg
<b>Αμφοτερικίνη Β κολλοειδές διάλυμα</b> ( <i>Amphocil</i> ) Sol pd Inf 1 x 50 mg/20 ml, IV Sol pd Inf 1 x 100 mg/50 ml, IV		2-6 mg/kg IV έγχυση σε 2-3 ώρες		2-6 mg/kg IV έγχυση σε 2-3 ώρες	24	10 mg/kg
<b>Βορικοναζόλη</b> ( <i>Vfend</i> ) Tabl 14 x 50 mg Tabl 14 x 200 mg Inj Vial 200 mg, IV	800 mg (1η ημέρα) 400 mg (ακολουθώς)	12 mg/kg (1η ημέρα) ακολουθώς 8 mg/kg IV	12 mg/kg (1η ημέρα) ακολουθώς 8 mg/kg	12 mg/kg (1η ημέρα) ακολουθώς 8 mg/kg IV	12	800 mg
<b>Γριζεοφουλβίνη</b> ( <i>Grisenova</i> ) Tabl 36 x 250 mg, Δεν διατίθεται	0,5-1 g		15 mg/kg		24	1 g
<b>Εκοναζόλη</b> ( <i>Pevaryl</i> ) Cream 30 g, 1%, Cream Vag 78 g, 1% Spray 30 ml, 1% Ovules, 3 x 150 mg (Bismultin Cream 40 g, 1%, PD 40 g 1%, Ovules, 3 x 150 mg, Mycobacter Spray 30 ml, 60 ml 1%, Cream Vag 78 g, 1%, Penicomb Cream 45 g, 1%, Unifungin Cream 30 g, 1%)*	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			

1. Αρχίζουμε με δοκιμαστική δόση 0,1 mg/kg στα παιδιά και 1 mg στους ενήλικες.

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ		ΠΑΙΔΙΑ		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>Εκοναζόλη/Τριακινολόνη</b> ( <i>Pevison</i> ) Cream 15 g (1%+0,1%)	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			
<b>Ισοκοναζόλη</b> ( <i>Travogen</i> ) Tabl Vag 7 x 100 mg Tabl Vag 2 x 300 mg Supp Vag 1 x 600 mg Spray 20 ml, 1 %, Cream 15 g, 1%, Cream Vag 40 g	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			
<b>Ισοκοναζόλη/Διφθοριο- κορτολόνη</b> ( <i>Travocort</i> ) Cream 15 g (1%+0,1%)	Τοπική χρήση		2 φορές		Έκζεμα επιμολυσμένο με μύκητες	
<b>Ιτρακοναζόλη</b> ( <i>Sporanox</i> ) Caps 4, 6, 15, x 100 mg Sirop 150 ml x 10 mg/ml ( <i>Itrazol, Mesmor</i> ) Sirop 150 ml x 10 mg/ml	200-400 mg		5-10 mg/kg		24	400 mg (600 mg σε ασπέργιλλο)
<b>Κασποφουγγίνη οξική</b> ( <i>Casprofungin MSD</i> ) Inj Vial, 50, 70 mg, IV		50-70 mg IV	Δεν συνιστάται < 18 ετών		24	70 mg
<b>Κετοκοναζόλη</b> ( <i>Fungoral</i> ) Tabl 10 x 200 mg Cream 30 g, 2% Shampoo x 120 ml, 2%, Shampoo x 200 ml, 1% (Abba Shampoo x 120 ml, 2%, Adenosan Shampoo x 120 ml, 2%, Aquarius Tabl 10 x 200 mg, Shampoo x 120 ml, 2%, Botaderm Shampoo x 180 ml, 2%, Cezolin Tabl 10 x 200 mg, Ebersept Tabl 10 x 200 mg, Cream 30 g, 2%, Shampoo x 120 ml, 2% Igem Tabl 10 x 200 mg, Cream 30 g, 2%, Shampoo x 120 ml, 2%, Ketoconazole Cream 30 g, 2%, Shampoo x 120 ml, 2%, Mycofebrin Tabl 30 x 200 mg, Neo-Egmol Shampoo x 120 ml, 2%, Scalpin Shampoo x 120 ml, 2%, Sostatín Tabl 10 x 200 mg)*	200-400 mg		5-10 mg/kg		12-24	800 mg  1-2 φορές την ημέρα 4 εβδομάδες
<b>Κλοτριμαζόλη</b> ( <i>Canesten</i> ) Tabl Vag 6 x 100 mg Tabl Vag 1 x 500 mg Sol 20 ml, 1% Cream Vag 20 g, 2%, Cream 20 g, 1% ( <i>Factodin</i> )* Cream 20 g, 1%	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση		1 φορά	
<b>Μικοναζόλη</b> ( <i>Daktarin</i> ) Amp 5 x 20 ml x 200 mg, διατίθεται από ΙΦΕΤ Cream 30 g 2% Tinct 30 ml, 2% Lotion 30 ml 2% Gel oral 40 g, 2%, Powder 20 g, 2% Cream Vag 78 g, 2% Supp Vag 7 x 200 mg, Supp Vag 3 x 400 mg (Fartersol Cream 30 g, 2%, Medacter Cream 30 g, 2%, Mezolitan Cream 30 g, 2%, Powder 20 g, 2%, Untano Cream 30 g, 2%, Powder 25 g, 2%, Cream Vag 80 g, 2%)*	1200-3600 mg IV		20-40 mg/kg IV		8	3,6 g
<b>Μικοναζόλη/Υδροκορτιζόνη</b> ( <i>Daktodor</i> ) Cream 15 g (2%+1%)	Τοπική χρήση		1-2 φορές		Έκζεμα επιμολυσμένο με μύκητες	1-2 εβδομάδες
<b>Μικοναζόλη/Φλουορεδνιδένη</b> ( <i>Verdal</i> ) Cream 20 g, 50 g (2%+0,1%) (Antimycotic, Catrigel, Combi, Conazol, Edmudo, Expectein, Fumicon, Micoflup, Mico gen, Mifler, Oxigon, Panderm, Panmyk). Όλα όπως το Verdál.						
<b>Nystatin</b> ( <i>Mycostatin</i> ) Susp 30 ml x 10 <sup>5</sup> U/ml Tabl 12 x 500.000 U ( <i>Nystamont</i> ) Susp 30 ml x 10 <sup>5</sup> U/ml, διατίθεται από ΙΦΕΤ	1,2-3 x 10 <sup>5</sup> U		1,2-2,4x10 <sup>5</sup> U		6-8	3x10 <sup>5</sup> U

\* Ιδιοσκευάσματα με την ίδια χημική ουσία.

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ημερήσια δόση		ΠΑΙΔΙΑ Ημερήσια δόση		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>Ομοконаζόλη</b> ( <i>Fongamil</i> ) Cream 30 g, 1%	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			
<b>Τερβιναφίνη</b> ( <i>Lamisil</i> ) Tabl 14 x 250 mg Cream 15 g, 1% Gel 15 g, 1% Pump Spray 30 ml, 1% (Demsil Cream 15 g, 30 g, 1%, Romiver Cream 15 g, 1%, Terbafin Cream 15 g, 1%, Terbigram Cream 15 g, 130 g, 1%, Sol 30 ml, 1%, Termisil Cream 15 g, 30 g, 50 g, 1%)	250-500 mg		Δεν συνιστάται		12-24	50 0mg
<b>Τιοκοναζόλη</b> ( <i>Cotinazin</i> ) Tabl Vag 3 x 100 mg Cream Vag 20 g, 2%, Cream 30 g, 1% Spray 30 ml, 1% Powder 30 g, 1%	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			
<b>Τολσικιλίτη</b> ( <i>Tolmicil</i> ) Cream 30 g, 1% Powder 100 g, 0,5% Lotion 30 ml, 1%	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			
<b>Φεντικοναζόλη</b> ( <i>Lomexin</i> ) Cream 30 g, 2% Gel 30 g, 2%, Spray 30 ml, 2%	Τοπική χρήση		Τοπική χρήση			
<b>Φλουκοναζόλη</b> ( <i>Fungustatin</i> ) Caps 7 x 50 mg, 100 mg Caps 1 x 150 mg Inj Vial 50 ml x 100 mg, IV (Figalol Caps 50 mg, 100 mg, Flucodrug Caps 100 mg, Inj 100 mg/50 ml, Fluconazole/Novexal Inj 100 mg/50 ml, Flusenil Caps, 50 mg, 150 mg, Fungusteril Caps, 50 mg, 150 mg, Gynosant Caps 100 mg, 150 mg, Hadlinol Caps 50 mg, 100 mg, Inj 100 mg /50 ml, Rifagen Caps 50 mg, 100 mg, Inj 100 mg/50 ml, Stabilanol Caps 100 mg, 150 mg, Inj 100 mg/50 ml, Tierlite Caps 50 mg, 100 mg, Inj 100 mg/50 ml, Varmec Inj 100 mg/50 ml, Zidonil Caps 100 mg)*	200-800 mg	200-800 mg IV	3-10 mg/kg	3-10mg/kg IV	12	800 mg (παιδιά: 10 mg/kg)
<b>Φλουκυτοσίνη</b> ( <i>Flucytosine</i> ) Inj Vial 5 x 2,5 g/250 ml, IV		50-150mg/kg IV		50-150 mg/kg IV	6	150 mg/kg
<b>ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ</b>						
<b>Ακυκλοβίρη</b> ( <i>Zovirax</i> ) Tabl 25 x 200 mg Tabl 70 x 400 mg Tabl Disp 35 x 800 mg Sirop 100 ml x 400 mg/5 ml Inj Vial 5 x 250 mg Eye Oint 4,5 g, 3% Cream 5%, 2 g, 5 g, 10 g (Abduce Cream 5%, Amitrox Cream 5%, Biozirox Tabl 25 x 200 mg, Tabl 10 x 400 mg, Cream 5%, Cargosil Tabl 25 x 200 mg, Tabl 70 x 400 mg, Cream 5%, Eye Oint 4,5 g, 3%, Cevinolon Tabl 25 x 200 mg, Cream 5%, Clovirax Cream 5%, Cycloviran Tabl 25 x 200 mg, Tabl 70 x 400 mg, Cream 5%, Erpizon Cream 5%, Erpaclovir Cream 5%, Etasisen Cream 5%, Fibrilan Cream 5%, Hagevir Tabl 25 x 200 mg, Cream 5%, Helposol Tabl 25 x 200 mg, Cream 5%, Herzkur Tabl 25 x 200 mg, Tabl 70 x 400 mg, Cream 5%, Neldim Cream 5%, Pulibex Cream 5%, Uniplex Tabl 30 x 400 mg, Cream 5%, Verpir Cream 5%, Virusteril Cream 5%, Xorox Tabl 70 x 400 mg Tabl 35 x 800 mg, Cream 5%, Eye Oint 4,5 g, 3%, Zeramil Tabl 25 x 200 mg, Tabl 70 x 400 mg, Cream 5%, Zidovimm Cream 5%)*	1-4 g	15-30 mg/kg IV έγχυση σε 1 ώρα	30-60 mg/kg	30-45 mg/kg IV έγχυση	6 PO <sup>2</sup> 8 IV	Ενήλικες: 4 g PO 30 mg/kg IV Παιδιά: 80 mg/kg PO 60 mg/kg IV
<b>Αμανταδίνη</b> ( <i>Symmetrel</i> ) Caps 60 x 100 mg	100-200 mg		5-8 mg/kg		12-24	200 mg
<b>Αμπακαβίρη</b> ( <i>Ziagen</i> ) Tabl 60 x 300 mg Oral sol 240 mg x 100 mg/5 ml	600 mg		5-8 mg/kg		12	600 mg

2. Πολλοί συνιστούν την ανά 4ωρο PO χορήγηση της ακυκλοβίρης ή 5 δόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ημερήσια δόση		ΠΑΙΔΙΑ Ημερήσια δόση		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>Αμπρεναβίρη</b> ( <i>Agenerase</i> ) Sof Caps 480 x 50 mg Sof Caps 240 x 150 mg Solution 15 mg/ml	2400 mg (1200 mg x 2)		< 50 kg 40 mg/kg > 50 kg 240 mg		12	2800 mg
<b>Βαλασικλοβίρη</b> ( <i>Valtrex</i> ) Tab10 x 500 mg Tab 42 x 500 mg	3 g	Δεν έχει καθοριστεί			8	8 g
<b>Βινταραμπίνη<sup>3</sup></b> ( <i>Vidarabin</i> ) Inj Vial 1 g Pomm 10 g, 3%, Pomm Ophth 5 g, 3% Δεν διατίθεται ( <i>Tekarin, Vireprin</i> ) Oitm 10 g, 3%	Τοπική χρήση	10-15 mg/kg, IV έγχυση σε 12 ώρες	Τοπική χρήση	10-30 mg/kg, IV έγχυση σε 12 ώρες	24	15 mg/kg ενήλικες
<b>Γκανκιλοβίρη</b> ( <i>Cymevene</i> ) Inj Vial 1 x 500 mg, IV Caps 84 x 250 mg Caps 90 x 500 mg		10 mg/kg, IV (5-6 mg/kg δόση συντήρησης)		10 mg/kg, IV (5-6 mg/kg δόση συντήρησης)	12	10 mg/kg
<b>Διδανσοίνη-ddl</b> ( <i>Videx</i> ) Tabl chw 60 x 50 mg, 100 mg, 150 mg Tabl disp 60 x 200 mg Caps 30 x 250 mg, 400 mg Powder oral solution 2 g	250-400 mg		100-300 mg/m <sup>2</sup> ή < 60 kg 250 mg		12	500 mg
<b>Εφαβιρένζη</b> ( <i>Stocrin</i> ) Tabl 30 x 600 mg Caps 30 x 50 mg, 100 mg Caps 90 x 200 mg	600 mg		10-15 mg/kg < 40kg: 15 mg/kg > 40kg: 10 mg/kg		24	600 mg
<b>Ζαλιτοβίνη-ddC</b> ( <i>Hivid</i> ) Tabl f/c 100 x 0,375 mg Tabl f/c 100 x 0,75 mg	2,25 mg		0,015-0,03 mg/kg		8	2,25 mg
<b>Ζαναμβίρη</b> ( <i>Relenza</i> ) Powder Inhal 5 mg/εισπνοή (Rotadisk x 4 δόσεις)	10-20 mg				12	20 mg
<b>Ζιδοβουδίνη-ZDV</b> ( <i>Retrovir</i> ) Caps 100 x 100 mg Caps 40 x 250 mg Tabl 60 x 300 mg Sirop 200 ml x 50 mg/5 ml Inj Vial 5 x 200 mg/20 ml, IV	500-600 mg	800-1200 mg	180 mg/m <sup>2</sup> x 4 ημερησίως		4-8	1200 mg
<b>Ιντιναβίρη</b> ( <i>Crixivan</i> ) Caps 135 x 333 mg Caps 360 x 200 mg Caps 180 x 400 mg	> 4 g (800 mg/8ωρο)		1,5 g/m <sup>2</sup>		8	2,4 g
<b>Λαμβουδίνη, 3TC</b> ( <i>EpiVir</i> ) Tabl 60 x 150 mg Sirop 240 ml x 50 mg/5 ml ( <i>Zeffix</i> ) Tabl 28 x 100 mg Sirop 240 ml x 25 mg/5 ml	300 mg		8 mg/kg < 50 kg 4 mg/kg		12	600 mg ενήλικες 300 mg παιδιά

3. Η παρεντερική μορφή δεν διατίθεται στην Ελλάδα.

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ημερήσια δόση		ΠΑΙΔΙΑ Ημερήσια δόση		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>Λαμβουδίνη, 3TC</b> <b>Ζιδοβουδίνη-ZDV</b> ( <i>Combivir</i> ) Tabl 60 x (150 mg+ 300 mg)	2 Tabl		2Tabl για >12 ετών		12	2 Tabl
<b>Λαμβουδίνη, 3TC</b> <b>Ζιδοβουδίνη-ZDV/</b> <b>Αμπακαβίρη</b> ( <i>Trizivir</i> ) Tabl 60 x (150+300+300) mg	2 Tabl		Δεν έχει καθοριστεί		12	2 Tabl
<b>Λοπιναβίρη/Ριτοναβίρη</b> ( <i>Kaletra</i> ) Caps 90 x (133,6+33,3 mg) Caps 36 x (133,6+33,3 mg) Sol Oral 60 ml x (80 mg+20 mg/ml)	800 mg+200 mg		460+115 mg/m <sup>2</sup>		12	800 mg+200 mg Στα παιδιά: 600+150 mg/m <sup>2</sup>
<b>Μεθισοπρινόλη</b> ( <i>Isoprinosine</i> ) Tabl 30 x 500 mg	1 g (500 mg)					1 g
<b>Νεβιραπίνη</b> ( <i>Viramune</i> ) Tabl 60 x 200 mg Sirop 240 ml x 50 mg/5 ml	200-400 mg 200 mg x 1 x 14 ημέρες Μετά 200 x 2 ημερησίως		0,4 mg/m <sup>2</sup>		12-24	400 mg
<b>Νελφιναβίρη</b> ( <i>Viracept</i> ) Tabl 270 x 250 mg Oral Pd 144 g (50 mg/g)	2,5 g		60-90 mg/kg		8-12	2,5 g
<b>Οσελταμιβίρη</b> ( <i>Tamiflu</i> ) Caps 10 x 75 mg Sirop 30 g x 12 mg/ml	150 mg x 5 ημέρες			4 mg/kg x 5 ημέρες	12	150 mg ενήλικες
<b>Ριμπαβιρίνη</b> ( <i>Rebetol</i> ) Caps 168 x 200 mg	5-6 Caps		10-15 mg/kg		12	1,2 g
<b>Ριτοναβίρη</b> ( <i>Norvir</i> ) Caps 336 x 100 mg Sol Oral 5 x 90 ml x 400 mg/5 ml	1,2 g		100-800 mg/m <sup>2</sup>		12	1,2 g
<b>Σακίναβίρη</b> ( <i>Invirase</i> ) Caps 270 x 200 mg ( <i>Fortovase</i> ) Sof Caps 180 x 200 mg	1,8 - 3,6 g		100-150 mg/kg		8	7,2 g
<b>Σταβουδίνη</b> ( <i>Zerit</i> ) Caps 56 x 30 mg, Caps 56 x 40 mg Oral Sol 200 ml x 5 mg/5 ml	0,08 g		2 mg/kg		12	2 mg/kg
<b>Τενοφοβίρη</b> ( <i>Viread</i> ) Tabl 30 x 245 mg	300 mg		Δεν έχει καθοριστεί		24	300 mg
<b>Φαμισκλοβίρη</b> ( <i>Famvir</i> ) Tabl 10 x 125 mg Tabl 21 x 250 mg, Tabl 21 x 500 mg	500 mg - 1,5 g				8-12	2,25 g
<b>Φωσκαρνάτη</b> ( <i>Foscavir</i> ) Inj Vial 6 g x 250 ml, 24 mg/ml, IV		180 mg/kg (90 mg/kg δόση συντήρησης IV)			8-12	180 mg/kg

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ημερήσια δόση		ΠΑΙΔΙΑ Ημερήσια δόση		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ</b>						
<b>Α. ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ</b>						
<b>Αιθαμβουτόλη</b> ( <i>Mycambutol</i> ) Tabl 50 x 400 mg ( <i>Dexambutol</i> ) Tabl 50 x 500 mg Διατίθεται από ΙΦΕΤ	15-25 mg/kg		15-25 mg/kg		24	2,5 g
<b>Ισονιαζίδη</b> ( <i>Dianicotyl</i> ) Tabl 100 x 100 mg Inj Amp 5 x 100 mg/2 ml ( <i>Nicozid</i> ) Tabl 100 x 100 mg, Tabl 50 x 200 mg Inj Amp 6 x 100 mg ( <i>Isoniazid</i> ) Tabl 100 x 100 mg Διατίθεται από ΙΦΕΤ	5 mg/kg	5 mg/kg IM	10-20 mg/kg	10-20 mg/kg IM	24	300 mg (600 mg σε μηνιγγίτιδα)
<b>Πυραζιναμίδη</b> ( <i>Pyrazinamide</i> ) Tabl 15 x 500 mg	25 mg/kg		20-40 mg/kg		24	2,5 g
<b>Ριφαμπικίνη</b> ( <i>Rifadin</i> ) Caps 16 x 150 mg, Caps 8 x 300 mg Tabl 4 x 600 mg Sirop 60 ml, 100 mg/5 ml ( <i>Rifadin</i> ) από ΙΦΕΤ Inj Vial 1 x 600 mg + Solv 10 ml Sirop 60 ml, 120 ml 100 mg/5 ml	10 mg/kg	600-900 mg IV	10-20 mg/kg	10-20 mg/kg IV	12-24	1,2 g
<b>Στρεπτομυκίνη</b> Inj Fl 1 x 1 g, IM		15 mg/kg IM		20-30 mg/kg IM	24	1 g
<b>Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ</b>						
<b>Βιομυκίνη</b> Δεν διατίθεται		1-2 g IM		1-2 g IM		2 g
<b>Θειοκεταζόλη</b> Δεν διατίθεται	3-5 mg/kg		3-5 mg/kg			150 mg
<b>Εθειοναμίδη</b> ( <i>Trecator</i> ) Tabl 100 x 250 mg, διατίθεται από ΙΦΕΤ	10-15 mg/kg		15-20 mg/kg		8-24	1 g
<b>Καναμυκίνη</b> Δεν διατίθεται		15-30 mg/kg IM		15-30 mg/kg IM		1 g
<b>Καπρομυκίνη</b> ( <i>Capastat</i> ) Inj Vial x 1 g + Solv 2 ml, διατίθεται από ΙΦΕΤ		15 mg/kg IV, IM		15-20 mg/kg IV, IM	24	1 g
<b>Κυκλοσερίνη</b> ( <i>D-cycloserine</i> ) Tabl 100 x 250 mg ( <i>Seromycin</i> ) Tabl 40 x 250 mg Διατίθεται από ΙΦΕΤ	15-20 mg/kg		15-20 mg/kg		6-12	1 g
<b>Παρα-αμινο-σαλικυλικό</b> Tabl 500 mg, δεν διατίθεται	200 mg/kg		200 mg/kg		12	12 g
<b>Γ. ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΥΠΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ</b>						
<b>Δαψόνη</b> ( <i>Dapsone</i> ) Tabl 50 mg, δεν διατίθεται	100 mg				24	100 mg

Φάρμακο (Ιδιοσκεύασμα) Μορφές	ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ημερήσια δόση		ΠΑΙΔΙΑ Ημερήσια δόση		ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ μεταξύ δόσεων σε ώρες	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
	Από το στόμα	Παρεντερικά	Από το στόμα	Παρεντερικά		
<b>Κλαριθρομυκίνη</b> (Klaricid) Tabl 12 x 250 mg Tabl 21 x 500 mg Tabl O.D 6 x 500 mg Tabl O.D 14 x 500 mg Sirop 50 ml, 60 ml, 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml Inj Vial 1 x 500 mg (Claripen Tabl 21 x 500 mg, Sirop 60 ml, 250 mg/5 ml Sirop 60 ml, 250 mg/5 ml, Claromycin Tabl 21 x 500 mg, Ezymycin Tabl 21 x 500 mg, Zeclaren Tabl 12 x 250 mg, Tabl 21 x 500 mg, Tabl O.D 6 x 500 mg, Tabl O.D 14 x 500 mg Sirop 50 ml, 60 ml, 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml)*	1 g	1 g IV	25-30 mg/kg	25-30 mg/kg IV	12	1 g
<b>Κλοφαζιμίνη</b> (Lamprene) Tabl 100 x 100 mg	100 mg				12-24	100 mg
<b>Ριφαμπουτίνη</b> (Mycobutin) Caps 30 x 150 mg Caps 100 x 150 mg Διατίθεται από ΙΦΕΤ	300 mg		5 mg/kg		24	600 mg
<b>Δ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΩΝ</b>						
<b>Ισονιαζίδη + Ριφαμπικίνη</b> (Oboliz) Tabl 12 x (150+300) mg (Rifinah) Tabl 16 x (150+300) mg (Rimactazid) Tabl 10 x (150+300) mg	2 tabl				24	2 tabl
<b>Ισονιαζίδη + Αιθαμβουτόλη</b> (Myabuto-INH) Tabl 30 x (100+365) mg	3 tabl				24	3 tabl
<b>Ισονιαζίδη + Ριφαμπικίνη + Πυραζιναμίδη</b> (Rifater) Tabl 60 x (50+120+300) mg	3-6 tabl				24	6 tabl

#### ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΥΧΗ 97-102, 2002

Acinetobacter calcoaceticus-baumani	425	Βανκομυκίνη	438
Aερομονάδα hydrophila	425	Βιντραομπίνη	446
Αζλοσυλλίνη	432	Βιομυκίνη	448
Αζτρεονάμη	433	Β-λακταμικά αντιβιοτικά	431
Αιθαμβουτόλη	448	Βορικοναζόλη	443
Αμφοφιλος aethrophilus	425	Βρουκέλλα(Brucella melitensis,	426
duceyi	425	B. suis, B. abortus, B. canis	426
Influenzae	425	Calymatobacterium granulomatis	429
Ακυκλοβίρη	445	Γερσίνια	426
Αμανταδίνη	445	Γκανκυκλοβίρη	446
Αμινογλυκοσίδες	436	Γλυκοπεπτιδία	438
Αμικασίνη	436	Γριζεοφουβίνη	443
Γενταμικίνη	436	Δαψόνη	448
Νεομυκίνη	437	Διδονοσίνη-ddl	446
Νετιμυκίνη	436	Δικλοξακιλλίνη	432
Σισομυκίνη	437	Δονάκιο χολέρας	426
Σπεκτινομυκίνη	437	Εθειοναμίδη	449
Στρεπτομυκίνη	437, 449	Εκοναζόλη	443
Τομπραμυκίνη	437	Epiterobacter	426
Αμιδονοκιλλίνη	432	Ελικοβακτηρίδιο pylori	426
Αμοξικιλίνη	432	<b>Επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας</b>	<b>423</b>
Αμοξικιλίνη/Κλαβουλανικό	433	Ερταπενέμη	433
Αμπακαβίρη	445	Ερυθρομυκίνη/Σουλφισοξαζόλη	441
Αμπικιλίνη	432	Ερυσιπελόθριξ rhusiopathiae	425
Αμπικιλίνη/Σουλμπακτάμη	433	Εφαβιενίνη	446
Αμπρεναβίρη	446	Ζαλιτιοβίνη-ddC	446
Αμφοτερικίνη Β	443	Ζαναμβίρη	446
Αμφοτερικίνη Β λιποσωμακία	443	Ζιδοβουδίνη-ZDV	443
<b>Αντιβιοτικά, 2002</b>	<b>431</b>	Θειοκεταζόλη	448
Αντι-ικά	446	Ιμπενέμη/Σιλαστατίνη	433
Αντιμυκητιακά	443	Ιντιναβίρη	446
<b>Αντιμυκητιακά, αντι-ικά, αντιφυματικά φάρμακα, 2002</b>	<b>443</b>	Ισοκοναζόλη	444
Αντισταφυλοκοκκικές πενικιλίνες	432	Ισονιαζίδη	448
Αντιφυματικά φάρμακα	448	Ισονιαζίδη + Αιθαμβουτόλη	449
Αραχνία (Arachnia) propionica	429	Ισονιαζίδη + Ριφαμπικίνη	449
Bacteroides fragilis	428	<b>Ισονιαζίδη + Ριφαμπικίνη + Πυραζιναμίδη</b>	<b>449</b>
Βάκιλος anthracis	424	Ιτρακοναζόλη	444
B. cereus, B. subtilis	425	Καμπυλοβακτηρίδιο fetus	426
Βαλασικλοβίρη	446	Jejunii	426

Καναμικίνη	448	kansasii	429
Καπρεομικίνη	448	leprae	430
Καρβενικιλίνη	432	marinum	430
Κασποφουγίνη οξική	444	tuberculosis	429
Κετοκοναζόλη	444	Μυκόπλασμα pneumoniae	430
Κεταλίδες	439	Ναϊσσερία gonorrhoeae	425
Κεφαλοσπορίνες 1ης γενεάς	433	Meningitides	425
Κεφαδροξίλη	433	Νεβιραπίνη	447
Κεφαζολίνη	434	Νελφινάβιρη	447
Κεφαλεξίνη	434	Νιτροφουράνια	442
Κεφαλοθίνη	434	Νιτροφουραντοίνη	442
Κεφαπυρίνη	434	Νοκάρδια asteroides	429
Κεφραδίνη	434	Νυστατίνη	444
Κεφαλοσπορίνες 2ης γενεάς	434	Ομοκοναζόλη	445
Κεφακλόρη	434	Οξαζολιδόνες	439
Κεφαμανδόλη	434	Οξακιλίνη	432
Κεφατριζίνη	434	Οσελταμίβιρη	447
Κεφοξιτίνη	434	Παρα-αμινο-σαλικυλικό οξύ	448
Κεφορανιόνη	435	Παστερέλλα (Pasteurella) multocida	427
Κεφουροξίμη	435	Πενικιλίνη	431
Κεφροζόλη	435	Peptostreptococcus	429
Λορακαρμπένη	435	Πιπερακιλίνη	432
Κεφαλοσπορίνες 3ης γενεάς	435	Πιπερακιλίνη/Ταζομοπακτάμη	433
Κεφεταμέτη	435	Propionobacterium acnes, vulgaris	429
Κεφιξίμη	435	Providencia rettgeri	427
Κεφοταξίμη	435	Πρωτέας mirabilis, vulgaris	427
Κεφοδοξίμη	435	Πυραζιναμίδη	448
Κεφταζιδίμη	436	Quinupristin + Dalfopristin	438
Κεφτιμουπτενίνη	435	Ρικετίαιες	430
Κεφτριαξόνη	435	R. conorii	430
Κεφαλοσπορίνες 4ης γενεάς	436	R. prowazekii	430
Κεφεπιμή	436	R. rickettsii	430
Κεφπυρόμη	436	R. typhi	430
Κινολόνες	439	Ριμπαβιρίνη	447
Γρεπασφλοξασίνη	439	Ριτοναβίρη	447
Ενοξασίνη	439	Ριφαμπικίνη	442, 448
Κιπροφλοξασίνη	440	Ριφαμυτινίνη	443, 449
Λεβοφλοξασίνη	440	Ριφαξιμίνη	443
Μοξιφλοξασίνη	440	Σακινάβιρη	447
Ναλιδιξικό οξύ	440	Σαλιμονέλλα paratyphi	427
Νορφλοξασίνη	440	typhi, typhimurium	427
Οφλοξασίνη	440	Σερράτια liquidifaciens	427
Πεφλοξασίνη	440	marcescens	427
Σινοξασίνη	440	Σιγκέλλα	427
Κιτροβακτηρίδιο	426	<b>Σουλταμισιλίνη</b>	<b>433</b>
Citrobacter diversus	426	Σουλφαδιαζίνη	441
Citrobacter freundii	426	Σουλφοναμίδες	441
Κλινδαμικίνη	439	Σουλφοναμίδες και συνδυασμοί	441
Κλοξακιλίνη	432	Σπειροχαίτη ωχρά (Treponema pallidum)	430
Κλοτριμαζόλη	444	Spirillum minor	427
Κλοφαζιμίνη	449	Σταβουδίνη	447
Κλωσπιρίδια	428	Σταφυλόκοκκος aureus	423
Κολιστίνη	442	epidermidis	424
Κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli)	427	saprophyticus	423
Κορυνοβακτηρίδια ομάδας JK	425	Στρεπτόβακιλλος moniliformis	427
Κορυνοβακτηρίδιο diphtheriae	425	Στρεπτόκοκκος bovis, milleri	424
Κυκλοσερίνη	448	Στρεπτόκοκκος pneumoniae	424
Λαμβουδίνη 3TC	446	Στρεπτόκοκκος pyogenes ομάδας A	424
3TC Ζιδοβουδίνη-ZDV	447	Στρεπτόκοκκος ομάδας D	424
3TC Ζιδοβουδίνη-ZDV/Αμπτακαβίρη	447	Εντερόκοκκος faecalis, faecium	424
Λεϊτζιονέλλα (Legionella) pneumophilla	427	Στρεπτομικίνη	437, 448
Λεπτόσπειρα (Leptospira) interrogans	430	Τείκοπλανίνη	438
Λινεζολίδη	439	Τελιθρομικίνη	439
Λινκομικίνη	439	Τενοφοβίρη	447
Λιστέρια	425	Τερβιναφίνη	445
Λοπιναβίρη/Ριτοναβίρη	447	Τετρακυκλίνες	441
Μακρολίδες	437	Δοξυκυκλίνη	441
Αζιθρομικίνη	437	Μινκυκλίνη	441
Διφθρομικίνη	437	Οξετετρακυκλίνη	441
Ερυθρομικίνη	438	Τικαρκιλίνη	433
Κλαριθρομικίνη	438, 449	Τικαρκιλίνη/Κλαβουλανικό	433
Μιντεκαμυσίνη/Μισοκαμικίνη	438	Τιοκοναζόλη	445
Ροξιθρομικίνη	439	Τολοκλάτη	445
Σπειραμικίνη	439	Τριμεθοπρίμη/Σουλφαμεθόλη	441
Μεθικιλίνη	432	Τριμεθοπρίμη/Σουλφομεθοξαζόλη	441
Μεθισοπρινόλη	447	Φαισικλοβίρη	447
Μεροπενέμη	433	Φεντικοναζόλη	445
Μετρονιδαζόλη	442	Φλουκοναζόλη	445
Μικοναζόλη	444	Φλουκυτοσίνη	445
Morganella morganii, P. stuartii	427	Φουσιδικό οξύ	443
Μονοπακτάμες	433	Φρανσιέλλα (Francisella) tularensis	428
Μοραξέλλα (catarrhalis)	425	Φωσκαράνη	447
Μουπιροκίνη	443	Φωσφομικίνη	443
Μπαρτονέλλα (Bartonella henselae)	427	Ureaplasma urealyticum, hominis, fermentans	430
Μπορντετέλλα (Bordetella) pertussis	427	Χάφνια (Hafnia alvei)	428
Μπορρέλια (Borrelia) burgdorferi	430	Χλαμύδια pneumoniae (TWAR)	430
Μπορρέλια (Borrelia) recurrentis	430	psittaci, trachomatis	430
Μυκοβακτηρίδιο avium intracellulare	429	Χλωραμφενικόλη	442
bovis	429	Ψευδομονάδα	428
fortuitum	429		

Η Ενημερωτική Έκδοση για τις Λοιμώξεις έχει σκοπό τη σύντομη και υπεύθυνη ενημέρωση γενικών γιατρών, παθολόγων, παιδίατρων και του παραϊατρικού υγειονομικού προσωπικού σε επίκαιρα θέματα λοιμώξεων με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία Έκδοση της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Υπεύθυνοι κατά νόμο: Β. Συριοπούλου και Γ. Σαρόγλου - Ετήσια συνδρομή: 20 Ευρώ (τεύχη 6) - Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε φοιτητές - Αποστολή συνδρομών: Ενημερωτική Έκδοση για τις Λοιμώξεις, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών "Η Αγία Σοφία", Αθήνα, 11527, τηλ. 010 7467478 e-mail: vsyriop@cc.uoa.gr Επεξεργασία-Σελιδοποίηση: Γαβαλάς Αθ., Αγ. Κωνσταντίνου 40 - Μαρούσι, τηλ. 210 6109842. Εκτύπωση: ΟΣΤΡΑΚΟ Α.Ε. Τηλ. 210 6197311.